

Отчего у шпица появляется алопеция: причины и что делать

Облысение у шпица — распространённая проблема, с которой владельцы сталкиваются неожиданно: ещё вчера питомец выглядел отлично, а сегодня на шубке появились проплешины. Важно понять, что поредение — это не самостоятельное заболевание, а сигнал о нарушениях в организме.

Факторы могут быть самыми разными: от гормональных сбоев до кожных заболеваний. Некоторые состояния требуют немедленной консультации специалиста, другие поддаются коррекции дома, но точный диагноз должен поставить ветеринар после осмотра и анализов.

Основные причины алопеции у шпицев

Шпицы склонны к нескольким типичным заболеваниям, вызывающим потерю шерсти. Чаще всего встречаются эндокринные патологии, реакции на аллергены, кожные паразиты и дефицит питательных веществ. Каждая из этих причин требует в своём терапевтическом подходе.

Гормональный фон непосредственно сказывается на состоянии кожи и шерсти. Сбои щитовидной железы, дисбаланс половых гормонов или болезни надпочечников вызывают равномерному облысению на боках, на спине и в области бёдер. Шерсть делается безжизненной, истончается и покидает фолликулы.

Не менее важны и внешние факторы: неправильный корм, эмоциональное напряжение, плохие условия содержания и нехватка регулярного ухода. Представители породы особенно чувствительны к качеству питания и эмоциональному фону.

Каким образом распознать природную линьку от патологии

Некоторые владельцы путают обычную линьку с началом алопеции. Природный процесс происходит дважды в год и длится пару недель. При этом шерсть уходит равномерно по всему телу, не образуя залысин.

Признак	Нормальная линька	Алопеция
Симметричность	Да	Нет
Равномерно по телу	Да	Нет
Локальные залысины	Нет	Да
Состояние кожи	Чистая, без покраснений	Покраснения, шелушение
Зуд	Отсутствует	Часто присутствует
Длительность	2–4 недели	Дольше месяца
Сезонность	Весна и осень	В любое время года

Патологическое выпадение сопровождается дополнительными признаками: расчёсыванием, покраснением эпидермиса, перхотью, переменами в поведении животного. Когда вы заметили любой из таких признаков, нужно пойти к ветеринару.

Эндокринные причины выпадения шерсти

Пониженная функция щитовидной железы — наиболее распространённая эндокринных патологий, вызывающих облысение у собак этой породы. Недуг [сколько стоит вызвать ветврача на дом](#) прогрессирует постепенно, сопровождается вялостью, ожирением и понижением состояния покрова. Заключение подтверждается анализом крови на концентрацию гормонов щитовидки.

Дисбаланс эстрогена и тестостерона также может провоцировать потерю шерсти. У некастрированных животных это нередко обусловлено с патологиями яичников или семенников. После диагностики специалист может рекомендовать кастрацию как метод решения недуга.

- Гипотиреоз и снижение функции щитовидной железы

- Дисбаланс половых гормонов
- Патологии надпочечников и синдром Кушинга
- Сахарный диабет и нарушения обмена веществ

Кожные паразиты и грибковые заболевания

Блохи, клещи и влоседы причиняют питомцу серьёзный вред и служат распространённой причиной алопеции. Постоянный зуд заставляет шпица расчёсывать кожу до повреждений, что вызывает формирование залысин.

Грибковые инфекции требуют особого внимания: лишай передаётся не только на других питомцев, но и способен быть угрозой для человека. Лечение осуществляется противогрибковыми препаратами под контролем врача.

Демодекоз и зудневая чесотка выражаются сильным зудом, воспалением и локальным выпадением шерсти. Установление диагноза включает соскоб и микроскопическое изучение.

Аллергические реакции и пищевая непереносимость

Пищевая аллергия нередко проявляется дерматологическими признаками: зудом, покраснением, выпадением шерсти и воспалительным процессом в ушных раковинах. Протеин животного происхождения чаще всего выступает виновником реакции.

Исключающая диета — главный способ диагностики пищевой аллергии. Владелец переводит питомца на особый рацион с новым видом протеина и отслеживает состояние в течение нескольких недель.

сезонная аллергия или реакция на слюну блох также вызывают зуд и облысение. Немаловажно исключить все возможные раздражители из окружения питомца.

Питание и витаминная поддержка

Сбалансированный рацион — основа здоровой шерсти и кожного покрова. Дефицит омега-3 и омега-6, цинка, биотина и витаминов группы В приводит к пересыханию кожи и потере шерсти.

Качественный рацион должен содержать необходимое количество белка животного происхождения, жиров и микроэлементов. При необходимости специалист порекомендует добавки с учётом индивидуальных нужд питомца.

Резкая смена корма может вызвать не только желудочно-кишечные проблемы, но и ухудшение качества шерсти. Переход собаку на новый рацион постепенно, в течение 7–10 дней.

Стресс и условия проживания

Собаки этой породы отличаются повышенной эмоциональностью и остро реагируют на перемены в окружении. Смена места, появление другого члена семьи, громкие звуки или расставание с владельцем способны оказать толчок к развитию облысения.

Скученность, нехватка движения и редкие выгулы провоцируют постоянный эмоциональный стресс. Организм реагирует на напряжение выделением гормона стресса, что сбивает работу фолликулов шерсти.

1. Обеспечьте питомцу стабильный распорядок дня

2. Создайте спокойную обстановку без громких звуков
3. Уделяйте время играм и прогулкам
4. Постепенно приучайте собаку к изменениям в жизни

Диагностика причину облысения

Для верного установления фактора выпадения шерсти ветеринар проводит полное диагностирование. Оно охватывает визуальный осмотр эпидермиса, сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные методы.

Метод диагностикиЧто выявляетОсмотр и дерматоскопияСостояние кожи и фолликуловСоскоб кожиКлещи и паразитарные заболеванияАнализ кровиГормональный фон и обмен веществБиохимия кровиРаботу внутренних органовЦитологияВоспалительные процессыПосев на грибкиГрибковые инфекции

Лишь по завершении сбора всех данных специалист сможет поставить диагноз и назначить корректное терапевтическую схему. Самостоятельное определение часто вызывает запущенным формам недуга.

Меры владельцу при обнаружении проплешин

При начальных признаках алопеции стоит записаться к ветеринару и не заниматься самолечением. Не наносите на кожу питомца препараты без назначения врача.

- Запишитесь на приём к ветеринарному врачу
- Соберите информацию о рационе и изменениях в жизни питомца
- Не применяйте лекарственные средства без консультации
- Обеспечьте спокойную обстановку и качественный уход
- Следуйте рекомендациям специалиста по лечению

Специалист установит фактор выпадения шерсти и разработает индивидуальный план терапии. Терапия может включать изменение питания, медикаментозные средства, процедуры и регулярный контроль состояния животного.

Заключение

Облысение у шпица никогда не может оставаться проигнорированной. Чем быстрее вы обратитесь к ветеринару, тем выше шансы на благоприятное восстановление шерсти.

Часто задаваемые вопросы

Почему у шпица появились залысины?

Причин существует много: гормональные нарушения, кожные паразиты, аллергические реакции, эмоциональный стресс и неправильное питание. Точный диагноз поставит ветеринар после обследования.

Как отличить естественную линьку от патологического облысения?

При естественной линьке покров выпадает равномерно и не формирует залысин. При патологии появляются локальные залысины, часто сопровождающиеся зудом и воспалением.

Может ли патологическое облысение исчезнуть сама?

В некоторых ситуациях при удалении фактора (например, эмоционального стресса или несбалансированного рациона) шерсть может восстановиться сама. Однако при эндокринных и паразитарных заболеваниях требуется терапия.

Какие анализы стоит пройти собаке?

Как правило ветеринар назначает соскоб, лабораторное исследование крови на гормоны, биохимический анализ, цитологическое исследование и посев на грибки. Список определяется от симптомов.

Способна ли алопеция оказаться опасной для человека?

Если причина алопеции — грибковая инфекция (например, стригущий лишай), она может распространяться на человека. В прочих случаях облысение не представляет опасности для людей.

Через сколько время шубка восстанавливается после лечения?

Период определяются от фактора и уровня запущенности проблемы. При простых случаях шубка возвращается за 1–2 месяца, при сложных заболеваниях способно потребоваться более времени.